



La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Le port de Cap d'Ail

Depuis 2015, le port multiplie les certifications et label: "PORTS PROPRES", "PAVILLON BLEU" et "Ports propres actifs en biodiversité". En 2022, dans le cadre de sa Gestion Environnementale Portuaire, il a mis en place **1** hôtel à insectes à l'entrée du port : une des principales ressources en nourriture des oiseaux du port.

4,7 ha
de surface

+ de 40
espèces de flore
terrestre locale

1
hôtel à
insectes

PORTS PROPRES
ISO 18725 "Clean harbours" Certifiés par AFNOR Certification



PORTS PROPRES
actifs en biodiversité
ISO 18725 "Clean harbours" Certifiés par AFNOR Certification

Un port riche en biodiversité

Le port regroupe une diversité d'habitats, offrant ainsi des conditions favorables à de nombreuses espèces. Les poissons ainsi que la flore terrestre locale, située dans les espaces verts le long de la plage Marquet, offrent des ressources en nourriture pour certains oiseaux. L'installation d'un hôtel à insectes n'a fait qu'enrichir leur alimentation.



21

espèces
d'oiseaux



La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Bergeronnette grise, *Motacilla alba*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 18 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Son plumage varie du noir (haut de la tête et cou) au blanc (ventre, front et joues) en passant par différentes nuances de gris (dos et couverture des ailes). Longue queue noire bordée à l'extérieur de blanc.



Le port, une zone optimale:

Ce petit passereau se rencontre dans les espaces ouverts à végétation rase ou à sols nus, à proximité des maisons et des points d'eau. Pour son nid, elle utilise différentes cavités disponibles avec des brindilles et végétaux secs, disponibles à proximité du port.



Dans l'écosystème du port:

C'est un oiseau strictement insectivore qui se nourrit d'une grande variété de petits invertébrés. Ces insectes sont trouvables dans l'hôtel à insectes mais aussi sur la flore terrestre locale (ex: romarin) du port.



Le saviez-vous?

Sa longue queue toujours en mouvement lui vaut une silhouette facilement reconnaissable, même de loin.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Espèce protégée

Bergeronnette printanière, *Motacilla flava*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 17 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Longue queue qu'elle agite fréquemment. Le mâle a le ventre jaune vif et une tête grise marquée d'un net sourcil blanc, tandis que le plumage des femelles présente des teintes délavées plus discrètes.



Le port, une zone optimale:

Ce petit passereau se rencontre principalement dans les milieux ouverts et humides ou sur le littoral. Ses proies sont trouvables dans l'hôtel à insectes mais aussi sur la flore terrestre locale (ex: romarin) du port.



Dans l'écosystème du port:

C'est un oiseau strictement insectivore qui se nourrit d'une grande variété de petits invertébrés. Elle capture généralement ses proies au sol ou dans la végétation basse, mais peut aussi les attraper en plein vol.



Le saviez-vous?


Comme l'indique son nom, elle ne migre qu'en France en mars lors de sa période de reproduction.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Canard colvert, *Anas platyrhynchos*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 68 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: La femelle a le bec brun et le plumage (beige tacheté de brun. Le bec du mâle est jaunâtre ou verdâtre, plus ou moins taché de noir, ses pattes rouge-orangé et sa tête verte vive.



Le port, une zone optimale:

Ce canard peut vivre dans divers milieux pourvus qu'ils sont occupés d'une étendue d'eau calme et d'endroits pour cacher son nid. Le port de Cap d'Ail est donc un habitat idéal pour lui.



Dans l'écosystème du port:

Son régime est composé d'une grande variété de végétaux aquatiques, graines, herbes et petits invertébrés comme les insectes, mollusques et petits crustacés. Tous sont trouvables dans le port. Il se nourrit souvent en plongeant la tête et le cou dans l'eau pour se nourrir.



Le saviez-vous?

On peut souvent voir un couple de femelles de canard colvert dans les eaux du port! Elles doivent donc trouver le cadre agréable!

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Corneille noir, *Corvus corone*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 51 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Tout chez elle est noir, de la pointe du bec au bout de la queue en passant par l'œil et les pattes. Chez l'adulte, le plumage neuf est lustré et brille au soleil avec même des reflets bleus ou verts.



Le port, une zone optimale:

Très adaptable, la corneille fréquente aussi bien les campagnes, forêts et zones agricoles que les villes et les zones littorales. Elle peut être observée dans les parcs, sur les plages, près des ports et dans les espaces urbanisés.



Dans l'écosystème du port:

La Corneille noire est omnivore et opportuniste. Elle se nourrit d'insectes, de vers, de petits animaux, de graines, de fruits, de déchets alimentaires et parfois de charognes. Cette nourriture est disponible dans le port.



Le saviez-vous?

La Corneille noire est capable d'utiliser des outils pour accéder à de la nourriture ! Elle fait partie des oiseaux les plus intelligents et peut résoudre des problèmes complexes, mémoriser des lieux et reconnaître certains individus.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Espèce protégée

Fauvette à tête noire , *Sylvia atricapilla*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 14 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le mâle se distingue par le haut de la tête noire alors que la femelle et les juvéniles par leur « casquette » rousse.



Le port, une zone optimale:

La Fauvette à tête noire fréquente principalement les zones boisées, les jardins, les parcs et les secteurs végétalisés, où elle trouve des arbres, des arbustes et une végétation dense pour se nourrir et se protéger. À Cap-d'Ail, elle peut notamment trouver des habitats favorables dans les espaces verts et les secteurs boisés situés autour du port et sur les hauteurs de la commune.



Dans l'écosystème du port:

Son régime alimentaire varie selon les saisons. Elle consomme principalement des insectes et autres petits invertébrés pendant la période de reproduction. Ils sont disponibles sur la flore terrestre locale et dans l'hôtel à insectes du port.



Le saviez-vous?

La Fauvette à tête noire est capable d'apprendre de nouveaux chants ! 
Son chant est principalement produit par les mâles, notamment au printemps, pour attirer une partenaire et défendre leur territoire.



La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Espèce protégée

Fauvette mélanocéphale, *Sylvia melanocephala*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 14 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le mâle a la tête noire avec un cercle orbitaire rouge et une gorge très blanche ; la tête de la femelle est brune. Petite et assez élancée, le reste du corps est brun gris. De larges bords blancs de sa queue.



Le port, une zone optimale:

La Fauvette mélanocéphale fréquente principalement les milieux méditerranéens, notamment les maquis, les garrigues, les haies, les buissons et les zones de végétation dense. À Cap d'Ail, elle peut notamment être observée dans les secteurs végétalisés autour du port, les jardins et les zones de broussailles.



Dans l'écosystème du port:

Son régime alimentaire varie selon les saisons. Elle consomme principalement des insectes, des larves et des araignées pendant la période de reproduction. Ils sont disponibles sur la flore terrestre locale et dans l'hôtel à insectes du port.



Le saviez-vous?

La Fauvette mélanocéphale est particulièrement bien adaptée au climat méditerranéen. Elle peut rester présente dans nos régions pendant l'hiver, contrairement à de nombreuses autres fauvettes qui migrent vers des régions plus chaudes.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Goéland leucophée, *Larus michahellis*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 70 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Un dos et des ailes gris clair, son ventre et sa tête blancs, ainsi qu'à ses pattes jaunes. Son bec jaune est marqué d'une petite tache rouge.



Le port, une zone optimale:

Le Goéland leucophée fréquente principalement les côtes rocheuses, les plages, les îles et les zones portuaires. Il peut également s'adapter aux milieux urbains et construire son nid sur des bâtiments ou des structures artificielles. Au Port de Cap d'Ail, il peut être observé sur les quais, les digues, les rochers ou en vol au-dessus du port.



Dans l'écosystème du port:

Le Goéland leucophée est omnivore et opportuniste. Il se nourrit notamment de poissons, de crustacés, de mollusques, de petits animaux, d'œufs et de jeunes oiseaux, mais aussi de déchets alimentaires lorsqu'il en trouve. Cette grande diversité alimentaire lui permet de s'adapter facilement aux milieux fréquentés par l'être humain.



Le saviez-vous?


En plus de vous voler vos sandwiches, le Goéland leucophée est capable de boire de l'eau de mer ! Ses glandes situées au-dessus des yeux permettent d'éliminer l'excès de sel. Il peut ainsi vivre et s'alimenter dans des environnements marins où l'eau douce est peu disponible.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Grand Cormoran, *Phalacrocorax carbo*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 82 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: De courtes pattes, des pieds palmés, et un plumage noir à reflets verts et bronzés. Une zone blanche s'étend sur les joues et encadre une tâche jaune de peau nue à la gorge.



Le port, une zone optimale:

Le Grand Cormoran fréquente les milieux aquatiques : mers, côtes rocheuses, lacs, rivières, estuaires et zones portuaires. Il apprécie les endroits où il peut facilement trouver des poissons et disposer de zones pour se poser et sécher ses ailes. Au Port de Cap d'Ail, il peut notamment être observé posé sur les quais, les digues ou les rochers, ou plongeant à proximité des bateaux.



Dans l'écosystème du port:

Son régime alimentaire est essentiellement piscivore. Il s'immerge profondément ne laissant apparaître que le haut du dos, et il tend le cou incliné en arrière. Il plonge la tête pour épier les poissons et plongera ensuite pour pêcher souvent à proximité du fond.



Le saviez-vous?

Contrairement à de nombreux oiseaux aquatiques, le plumage du Grand Cormoran n'est pas étanche. Après avoir plongé, il est donc fréquent de le voir les ailes grandes ouvertes au soleil pour faire sécher ses plumes !

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Hirondelle de fenêtre, *Delichon urbicum*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 12 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Postérieur blanc, le dessus de son corps bleu métallique foncé, ses ailes noires, son ventre blanc pur et sa queue fourchue moyenne.



Le port, une zone optimale:

Cette espèce niche typiquement en milieu urbain sur les façades externes des bâtiments et autres constructions comme les ponts. Elle fréquente également les espaces ouverts à proximité des zones humides, où elle trouve sa nourriture. À Cap d'Ail, elle peut être observée en vol au-dessus du port et des bâtiments environnants, notamment pendant la période de reproduction et de migration.



Dans l'écosystème du port:

Elle consomme de petits insectes et des araignées capturés en vol. Elle chasse généralement à plusieurs mètres au-dessus du sol, mais peut descendre plus près de l'eau ou de la végétation lorsque les insectes y sont nombreux.



Le saviez-vous?

L'Hirondelle de fenêtre construit un nid en forme de petite coupe fermée, fabriqué avec de la boue. Elle rapporte de petites boulettes de terre humide qu'elle assemble progressivement pour construire son nid, souvent fixé directement contre une façade.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Espèce protégée

Hirondelle de rochers, *Ptyonoprogne rupestris*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 15 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Trapue, une coloration brun terne teinté de gris sur le dos, le dessous quant à lui est gris brunâtre très pâle et plus clair vers la gorge. La queue révèle deux taches blanches lorsqu'elle est en vol.



Le port, une zone optimale:

Elle fréquente principalement les falaises, parois rocheuses, gorges et reliefs, mais elle peut également s'installer sur des constructions humaines comme les ponts, les bâtiments ou certains ouvrages portuaires. À Cap d'Ail, elle peut profiter de la présence des falaises et reliefs rocheux à proximité du littoral, ainsi que des constructions offrant des surfaces adaptées à la nidification.



Dans l'écosystème du port:

L'Hirondelle de rochers est principalement insectivore. Elle capture de petits insectes directement en vol, notamment des mouches, moustiques et autres insectes volants. Ils sont disponibles sur la flore terrestre locale et dans l'hôtel à insectes du port.



Le saviez-vous?

L'Hirondelle de rochers peut rester dans les régions méditerranéennes pendant une grande partie de l'année. Elle est donc moins strictement migratrice que d'autres hirondelles et certaines populations peuvent être observées même en hiver.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Martinet noir, *Apus apus*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 17 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Pattes très courtes et réduites car fait pour le vol. Mâle et femelle sont semblables, de couleur noire avec une petite tache blanche sous la gorge



Le port, une zone optimale:

Pendant la migration, il fréquente volontiers les zones humides, au-dessus des étangs, des fleuves, le long du littoral où les oiseaux se regroupent en vol. À Cap d'Ail, il peut être observé en vol au-dessus du port, des bâtiments et du littoral, notamment pendant la période de reproduction.



Dans l'écosystème du port:

Le Martinet noir est insectivore. Il capture en plein vol de très petits insectes et autres petits organismes présents dans l'air, comme des moucheron, pucerons et petits coléoptères. Il peut également boire en vol en rasant la surface de l'eau. Ils sont disponibles sur la flore terrestre locale et dans l'hôtel à insectes du port.



Le saviez-vous?

Le Martinet noir passe une grande partie de sa vie dans les airs ! Il peut se nourrir, boire et même dormir en vol. Lorsqu'il ne niche pas, il passe ainsi presque tout son temps dans le ciel.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Merle noir, *Turdus merula*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 25 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le mâle possède un plumage tout noir avec un bec jaune orangé et un cercle oculaire jaune. La femelle est plus terne avec un plumage marron clair et des mouchetures sur la poitrine.



Le port, une zone optimale:

Le Merle noir fréquente une grande variété de milieux : forêts, haies, parcs, jardins et espaces urbains. Il apprécie particulièrement les endroits où la végétation est suffisamment dense pour lui offrir des abris et où il peut trouver de la nourriture au sol. À Cap d'Ail, il peut notamment être observé dans les jardins, espaces verts et zones végétalisées autour du port.



Dans l'écosystème du port:

Le Merle noir est omnivore. Il se nourrit principalement de vers de terre, insectes, araignées et autres petits invertébrés. Ils sont disponibles sur la flore terrestre locale et dans l'hôtel à insectes du port. Plus rarement, il peut consommer du poisson.



Le saviez-vous?


Le merle noir est particulièrement reconnu au printemps et en été par son puissant chant flûté. Ses cris d'alarme aigus et stridents ne passent pas inaperçus non plus.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Mésange charbonnière, *Parus major*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 15 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Dessous jaune et joues blanches. Plumage de couleur jaune ou jaune vert à l'exception des ailes et de la queue qui sont plutôt noires.



Le port, une zone optimale:

La Mésange charbonnière fréquente principalement les forêts, bois, haies, parcs et jardins. Elle s'adapte également très bien aux milieux urbains et peut vivre à proximité des habitations. À Cap d'Ail, elle peut notamment trouver des conditions favorables dans les espaces verts, jardins et zones végétalisées situés autour du port.



Dans l'écosystème du port:

Elle se nourrit principalement d'insectes et d'araignées mais aussi des graines, surtout en hiver. Ils sont disponibles sur la flore terrestre locale et dans l'hôtel à insectes du port.



Le saviez-vous?

La Mésange charbonnière possède un répertoire de chants et de cris très varié ! Elle utilise différents sons pour communiquer avec ses congénères, notamment pour signaler un danger, défendre son territoire ou attirer un partenaire.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Moineau domestique, *Passer domesticus*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 16 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le mâle a un dos brun rayé de noir, un menton et région oculaire noirs, des joues grisâtres, dessus de tête grise et nuque brun roux et un bec épais noir. La femelle est beaucoup moins colorée que le mâle.



Le port, une zone optimale:

Le Moineau domestique vit principalement à proximité de l'être humain. On le retrouve dans les villes, villages, jardins, parcs, bâtiments et zones portuaires. Il construit généralement son nid dans des cavités ou sous les toitures et peut facilement s'adapter aux milieux urbains. À Cap d'Ail, il peut être observé sur les quais, autour des bâtiments et dans les espaces végétalisés du port.



Dans l'écosystème du port:

Le Moineau domestique se nourrit de graines, de céréales et de petits végétaux, mais consomme également des insectes et leurs larves, particulièrement importants pour nourrir les jeunes. Il peut aussi profiter des ressources alimentaires présentes dans les zones fréquentées par l'être humain.



Le saviez-vous?

Le Moineau domestique est un oiseau très sociable : il vit généralement en groupes et peut former de véritables rassemblements autour des sources de nourriture.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Moineau cisalpin, *Passer italiae*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 16 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le mâle possède le haut de la tête roux, un cou et la poitrine noirs, ainsi qu'un plumage brun et gris. La femelle est plus discrète, dans des tons brun-beige.



Le port, une zone optimale:

Le Moineau cisalpin vit principalement à proximité de l'être humain. On le retrouve dans les villes, villages, jardins, parcs, bâtiments et zones portuaires. Il construit généralement son nid dans des cavités ou sous les toitures et peut facilement s'adapter aux milieux urbains. À Cap d'Ail, il peut être observé sur les quais, autour des bâtiments et dans les espaces végétalisés du port.



Dans l'écosystème du port:

Son alimentation est principalement composée de graines, de céréales et de petits végétaux. Pendant la période de reproduction, les adultes recherchent également de nombreux insectes et leurs larves, qui constituent une nourriture particulièrement importante pour les jeunes.



Le saviez-vous?

Le Moineau cisalpin est une espèce étroitement liée aux régions méditerranéennes. Il peut notamment vivre dans des environnements très urbanisés tout en restant proche des espaces naturels et agricoles.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Pigeon biset domestique , *Columba livia f. domestica*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 34 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le mâle possède le haut de la tête roux, un cou et la poitrine noirs, ainsi qu'un plumage brun et gris. La femelle est plus discrète, dans des tons brun-beige.



Le port, une zone optimale:

Le pigeon biset domestique est une espèce anthropophile, grégaire et diurne. Il fréquente les villes, villages, bâtiments, places, quais et ports, où les constructions lui offrent de nombreux abris et sites de nidification. Au Port de Cap-d'Ail, il peut être observé sur les quais, les bâtiments et les différentes infrastructures portuaires.



Dans l'écosystème du port:

Son alimentation est principalement composée de graines, de céréales et de végétaux. Il peut également consommer diverses ressources alimentaires disponibles dans les milieux urbains. Les déchets alimentaires à terre ou accessibles dans les poubelles sont une véritable mine d'or!



Le saviez-vous?

Les populations de pigeon biset domestique sont issues principalement sinon exclusivement d'animaux d'élevage ayant échappé au contrôle de l'homme: d'où son nom et le fait qu'il vive quasiment avec nous!

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Pigeon ramier, *Columba palumbus*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 42 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Tête, dos et ailes gris-bleu, ventre blanc rosé. Une tache blanche latérale est également présente et caractéristique sur le cou. Le bec est orangé avec sa base violacée.



Le port, une zone optimale:

Le Pigeon ramier fréquente principalement les forêts, bois, parcs, jardins et espaces agricoles. Il s'est également très bien adapté aux milieux urbains et peut être observé dans les villes et leurs espaces verts. À Cap-d'Ail, il peut notamment fréquenter les espaces végétalisés, jardins et secteurs boisés situés autour du port.



Dans l'écosystème du port:

Son alimentation est principalement composée de graines, de céréales et de végétaux. Il recherche généralement sa nourriture au sol, dans les espaces ouverts ou végétalisés.



Le saviez-vous?


Le Pigeon ramier peut effectuer de longues migrations saisonnières. Les populations du nord de l'Europe migrent notamment vers des régions plus méridionales en hiver, tandis que celles du sud sont souvent plus sédentaires.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Rougegorge familier, *Erithacus rubecula*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 14 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le front, le tour de l'œil, les joues et la poitrine sont orangés. Le dessus est brun olive uni et le dessous est blanchâtre. Le bec et les pattes sont bruns.



Le port, une zone optimale:

Le Rougegorge familier fréquente les forêts, bois, haies, jardins, parcs et espaces végétalisés. Il apprécie les endroits offrant une végétation dense où il peut se protéger et rechercher sa nourriture. À Cap-d'Ail, il peut notamment être observé dans les jardins, espaces verts et secteurs végétalisés autour du port.



Dans l'écosystème du port:

Le Rougegorge familier est insectivore, son régime alimentaire étant principalement composé d'invertébrés : insectes et leurs larves (coléoptères, chenilles, pucerons, perce-oreilles, fourmis, diptères...), des araignées, mille-pattes, cloportes, des vers de terre, de petits mollusques...



Le saviez-vous?

Malgré sa petite taille, le Rougegorge familier est très territorial. Il défend son territoire, notamment grâce à son chant, et peut se montrer particulièrement agressif envers les autres Rougegorges qui s'en approchent.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Rougequeue noir, *Phoenicurus ochruros*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 14 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le mâle, au printemps, arbore une livrée entièrement noire, hormis une tache alaire plus ou moins blanche et la queue rousse. La femelle est plus uniformément gris-brun.



Le port, une zone optimale:

Le Rougequeue noir affectionne les milieux rocheux et les zones urbaines, où il trouve facilement des cavités pour nicher. Il fréquente notamment les falaises, carrières, bâtiments, murs, toits et autres constructions.

À Cap-d'Ail, il peut être observé autour des bâtiments, quais, murs et secteurs rocheux à proximité du port.



Dans l'écosystème du port:

Le Rougequeue familier est insectivore. Se nourrit d'insectes et de larves saisies au vol. Ils sont disponibles sur la flore terrestre locale et dans l'hôtel à insectes du port.



Le saviez-vous?

Le Rougequeue noir est reconnaissable à sa queue rousse qui tremble et s'agite régulièrement lorsqu'il est posé. Ce mouvement caractéristique permet de le distinguer assez facilement d'autres petits passereaux.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Tourterelle turque, *Streptopelia decaocto*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 34 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Corps élancé. Couleur chamois grisâtre et rosé-brun avec une longue queue. Petite zone blanche et noire sur le cou formant un demi collier.



Le port, une zone optimale:

La Tourterelle turque fréquente principalement les zones urbaines et périurbaines, les jardins, parcs, villages et espaces agricoles. Elle apprécie la proximité des habitations et des endroits où elle peut trouver facilement de la nourriture. À Cap-d'Ail, elle peut être observée dans les espaces végétalisés, jardins et secteurs urbanisés autour du port.



Dans l'écosystème du port:

Son alimentation est principalement composée de graines, céréales et petits végétaux. Elle recherche généralement sa nourriture au sol, souvent dans les espaces ouverts ou à proximité des habitations.



Le saviez-vous?

La Tourterelle turque est une véritable championne de la colonisation : originaire d'Asie et du Moyen-Orient, elle a progressivement étendu son aire de répartition vers l'Europe au cours du XX^e siècle. Elle est aujourd'hui largement répandue dans de nombreux pays européens.

La biodiversité du Port de Cap d'Ail

Oiseau



Verdier d'Europe, *Carduelis chloris*



Caractéristiques:

Taille: jusqu'à 16 cm de longueur

Origine: Espèce native de Méditerranée

Description: Le mâle porte des couleurs jaunes-verdâtres alors que la femelle est brune. Mâle et femelle arborent une bande jaune vif sur l'aile. Le bec du verdier est celui d'un granivore : il est de forme conique.



Le port, une zone optimale:

Le Verdier d'Europe fréquente les lisières de forêts, haies, parcs, jardins et espaces végétalisés. Il apprécie particulièrement les endroits où se trouvent des arbustes et des arbres, qui lui offrent à la fois nourriture et abri.

À Cap-d'Ail, il peut notamment être observé dans les jardins, espaces verts et secteurs végétalisés autour du port.



Dans l'écosystème du port:

Il se nourrit principalement de graines, notamment de graines de plantes herbacées et de petits fruits. Pendant la période de reproduction, il peut également rechercher des insectes et leurs larves, notamment pour nourrir les jeunes. Ils sont disponibles sur la flore terrestre locale et dans l'hôtel à insectes du port.



Le saviez-vous?

Le Verdier d'Europe possède un bec particulièrement robuste, qui lui permet de casser et d'ouvrir facilement de nombreuses graines. Il peut ainsi exploiter des ressources alimentaires difficiles d'accès pour d'autres petits oiseaux.